

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

DLP 19-7-69 956943

PUBLICATION PERIODIQUE

EDITION DE LA STATION DU LANGUEDOC

(Tél. 92.28.72)

(AUDE, GARD, HERAULT, LOZERE, PYRENEES-ORIENTALES)

Régisseur de recettes, Direction Départementale de l'Agriculture, 16, rue de la République - MONTPELLIER

C.C.P. : MONTPELLIER 5.238-57

Abonnement Annuel

N° 106 - JUILLET 1969/31

4 ème supplément

Tirage du 16/7/1969

TORDEUSE ORIENTALE

Commencer dès réception du présent bulletin la série des 3 traitements destinés à assurer la protection des fruits arrivant à maturité entre le 10 et le 25 Août.

Effectuer très minutieusement les 2 ème ou 3 ème traitements précédemment préconisés pour les fruits devant être récoltés avant le 15 Août en respectant scrupuleusement les délais légaux d'emploi relatifs aux insecticides utilisés.

Les traitements seront efficaces également contre l'Anarsia dont les larves sont actuellement fréquemment observées concurremment à celles de la Tordeuse dans les fruits en cours de récolte, dans les Pyrénées Orientales, l'Hérault, le Gard.

OIDIUMS DES ARBRES FRUITIERS A NOYAU

Sur abricotiers (P.O. - Aude, Hérault) et sur pêchers (toutes régions, en particulier pêches à chair jaune et Pavies), l'Oïdium se manifeste.

Il convient de limiter l'extension de la maladie par un traitement spécifique qui doit être exécuté aussi bien sur les arbres porteurs de fruits que dans les vergers dont la récolte a été enlevée.

CYLINDROSPORIOSE ET CERCOSPORE DU CERISIER

L'exécution ou le renouvellement d'un traitement anticryptogamique est indispensable pour combattre ces deux maladies dont l'extension prend des proportions inquiétantes.

LL. TROUILLON

POMMIER

(Carpocapse - Sésie - Eulia - Acariens)

La première génération de Carpocapse a causé quelques dégâts dans les régions montagneuses (Cévennes en particulier).

Dans les zones littorales, ces dégâts sont insignifiants. Néanmoins, la deuxième génération qui se manifesterait début Août risque d'occasionner de plus graves dégâts. C'est pourquoi une couverture insecticide doit être apportée dès la fin du mois de Juillet dans toutes les zones.

Le réseau de piégeage fait apparaître un vol très important de Sésie et quelques papillons d'Eulia. Ces deux ravageurs seront combattus en même temps que le Carpocapse.

Dans la lutte contre les acariens on choisira un adulticide et ovicide.

L'Inspecteur de la Protection des Végétaux : P. BERVILLE

M. BEZUT,

P 381